



Riktlinjer för ordination enligt Generella direktiv för vuxna i hemsjukvården 2020

VC *Krisling*

Datum 202003

Verksamhetschef (eller läkare med medicinskt ledningsansvar) *EFBR*



HSLF:FS 2017:37 ger möjlighet för läkare från regionens hälso- och sjukvård att upprätta skriftliga generella behandlingsanvisningar, så kallade generella direktiv till sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården. Dessa direktiv är riktade mot olika akuta sjukdomstillstånd. Direktiven ska omprövas regelbundet. Läkemedlen får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Given dos ska registreras i journalhandling.

Indikation	Läkemedel	Dosering	Antal tillfällen utan läkarkontakt	Anmärkingar
Akut allergisk reaktion (anafylaxi)	Emerade inj 0,3 mg/dos	En dos à 0,3 mg intramuskulärt	En gång	Läkare måste omedelbart kontaktas! 2 st injektionspennor ska finnas i förrådet
Svår allergisk reaktion	Betametason tabl 0,5 mg	12 tabletter som löses i vatten	En gång	Ges ej vid allvarlig, aktiv infektion
Allvarlig hypoglykemi vid diabetes	Glucagon inj endospruta	1 ml subcutant intramuskulärt eller intravenöst	Om ej svar inom 10 min upprepas dosen. Vid svar ges perorala kolhydrater	Ges ej vid överkänslighet mot Glucagon
Lungödem	Furosemid inj 10 mg/ml	4 ml intravenöst, ev intramuskulärt	En gång	Läkare måste omedelbart kontaktas! Ges ej vid överkänslighet mot furosemid.
Tillfällig förstoppning	Micro lax klymsa 5 ml	1 klymsa 5 ml rektalt	Två gånger	
Tillfällig svår förstoppning	Klyx klymsa 120 ml	120–240 ml rektalt	Två gånger	
Akut nästäppa	Nezeril endospipetter 0,5 mg/ml	1 x 4 i vardera näsborren	Kan upprepas max 7 dygn	
Smärta, feber	Alvedon tabl 500 mg alt. Alvedon supp 1 g	1–2 x 1–4 per os 1 x 1–4 rektalt	Kan upprepas under två dygn	Kombinera ej med andra paracetamolpreparat

OBS! Det åligger sjuksköterskan att kontrollera kontraindikationer och interaktioner i FASS (www.fass.se) samt varningstext i patientens journal.
Rekommenderas från Läkemedelsrådet i Skåne 2020-01-01. Revideras löpande samt årligen. För aktuell version se <http://vardgivare.skane.se/Vardriktlinjer/Lakemedel/Lakemedelsforrad/>