 <b>Östra Göinge</b> kommun	Diarienummer	Upprättad av Lotta Tyrberg (MAS) ÖG	Fastställt datum 2021-11-30
Dokumentnamn Standardvårdplan antikoagulantia	Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9	Berörda verksamheter Hälsa och omsorg	

Namn: \_\_\_\_\_ Personnummer: \_\_\_\_\_

### Bakgrund:

NOAK är en förkortning av Nya Orala Antikoagulantia – blodförtunnande läkemedel. I gruppen ingår läkemedel som Waran, Xarelto, Pradaxa, Eliquis och Lixiana. Dessa läkemedel minskar risken för blodproppar i viktiga organ som hjärna, lungor, hjärtats kranskärl eller i benens kärl. Vid intag av något av dessa läkemedel hämmas blodets förmåga att levera sig. Det innebär att en patient som tar detta läkemedel har en ökad blödningsrisk.

### Patienten är ordinerad (kryssa i alternativ):

- Waran
- Xarelto – Måste tas med mat
- Pradaxa – Bör tas med mat. Måste förvaras i blisterförpackningen
- Eliquis – Kan finnas i dos-påse
- Lixiana

### Målet med vårdplanen:

Säkerhetsställa vård vid behandling av blodförtunnande läkemedel.

### Läkemedelhantering:

- Sjuksköterska iordningsställer ordinerat läkemedel enligt ordination.
- Delegerad vårdnadspersonal administrerar eller överlämnar ordinerat läkemedel enligt ordination.


### Dokumentation under uppmärksamhetssymbol i verksamhetssystemet

- Ansvarig sjuksköterska dokumenterar vilket blodförtunnande preparat patienten är ordinerad under uppmärksamhetssymbolen i verksamhetssystemet.

### Informationshalsband

Patienten ska bära ett halsband med information om att de behandlas med blodförtunnande läkemedel

- Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att, vid övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret tillse att det finns halsband samt för att vid behov beställa nytt på PK mottagningen.
- Vårdpersonal ser till att patienten har halsbandet på sig samt att kontakt tas med sjuksköterska om halsbandet är försvunnit, smutsigt eller är sönder och behöver bytas.

 <b>Östra Göinge</b> kommun	Diarienummer	Upprättad av Lotta Tyrberg (MAS) ÖG	Fastställt datum 2021-11-30
Dokumentnamn Standardvårdplan antikoagulantia	Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9	Berörda verksamheter Hälsa och omsorg	

### Information/handledning till vårdnadspersonal:

Blodförtunnande läkemedel gör att patienten blöder lättare. Det kan uppstå blödningar vid normala koncentrationer av läkemedlet, som exempelvis blödning i ögonvitan, näsblödning, tarmlödning, tandköttblödningar blåmärken eller blödning från urinvägarna.

Förändrade matvanor, kraftig aptitlöshet, diarré eller kräkningar kan påverka effekten av behandlingen. Likaså andra infektioner och läkemedel.

### Kontakt med sjuksköterska/sjukvården

- Vid kontakt med sjukvård/sjuksköterska samt tandläkare, tala alltid om att patienten behandlas med blodförtunnande läkemedel.
- Vid nyttillkommen sjukdom med symtom såsom kräkning, feber, aptitlöshet ska sjuksköterskan konsulteras.
- Om patienten av någon anledning inte har fått sitt blodförtunnande läkemedel ska sjuksköterska konsulteras.
- Vid blod i urinen, avföringen, blodig upphostning, blodig kräkning, eller svår, ovanlig huvudvärk, misstänkt fraktur eller någon annan blödning som inte själv stannar av ska sjuksköterska omedelbart kontaktas.
- Även vid kraftigt trauma (våld, slag, fall) mot huvud och buk ska sjuksköterska kontaktas för vidare ställningstagande.